MMS - DMSO

Como utilizar em casos de AVC



Sumário

Protocolo Acidente vascular encefálico: Dióxido de cloro + DMSO 3

Sinais de um derrame são: 5

Instruções para superar um acidente vascular cerebral com MMS1 e DMSO 6

Dia 1 - no início de um derrame 8

Contato: ..... **Erro! Indicador não definido.**

Protocolo Acidente vascular encefálico: Dióxido de cloro + DMSO

Cerca de 700.000 acidentes vasculares cerebrais acontecem nos Estados Unidos a cada ano e, desse número, aproximadamente 150.000 mortes ocorrem. Portanto, os traços não são nada para serem ignorados. Quando um acidente vascular cerebral está chegando, siga o protocolo abaixo. Usando DMSO e MMS1 pode pará-lo em suas trilhas. Tanto o DMSO como o MMS1 irão dissolver os coágulos de sangue em todo o corpo, inclusive no cérebro. O DMSO tem sido usado nos EUA desde 1955 e muitas pessoas testemunharam como isso ajudou a superar os derrames. Da mesma forma, DMSO e MMS1 foram usados juntos para um aumento no benefício de milhares de pessoas.

Nota: Eu tenho usado MMS por 20 anos. No início de 2012, eu pessoalmente já havia ajudado mais de 50.000 pessoas em todo o mundo usando o MMS (e pontuei mais desde então, mas perdi a conta). Eu só ajudei uma pessoa que estava passando por um derrame, e isso foi bem-sucedido. O conselho que eu dou aqui é o que eu faria se estivesse tendo um derrame e um hospital não estivesse disponível para mim. Se houvesse um hospital disponível eu ainda faria isso: começaria o protocolo enquanto ainda estivesse em casa e continuaria a fazê-lo no caminho para o hospital, por mais tempo que fosse necessário. Quando voltei do hospital, continuaria com o protocolo. Na minha opinião, o uso de DMSO e MMS1 pode significar a diferença entre a vida e a morte, ou a diferença entre ter efeitos colaterais a longo prazo ou não. É, no entanto,

completamente da sua responsabilidade fazer ou não este protocolo.

Sinais de um derrame são:

• Rosto caído - Um dos lados do rosto cai ou está entorpecido? Peça para a pessoa sorrir. O sorriso da pessoa é desigual?

• Fraqueza do braço - Um braço está fraco ou dormente? Peça à pessoa para levantar os dois braços. Um braço se desloca para baixo??

• Dificuldade de fala - A fala é arrastada? A pessoa não consegue falar ou é difícil de entender? Peça à pessoa que repita uma frase simples, como "A grama é verde". A frase é repetida corretamente?

Se alguém apresentar algum desses sintomas, mesmo que os sintomas desapareçam, é hora de iniciar o protocolo abaixo ou levar a pessoa ao hospital imediatamente, se essa for a escolha deles.

Verifique a hora para saber quando os primeiros sintomas apareceram. No caso de procurar assistência médica, você ainda pode começar com as primeiras doses de DMSO, seguidas por MMS1 de acordo com as instruções a seguir. Colocar DMSO e MMS1 no corpo imediatamente pode salvar uma vida. E se você fizer isso, a pessoa pode estar bem quando for capaz de chegar ao hospital. Se for tomada a decisão de ir ao hospital, é melhor sempre chamar uma ambulância ou buscar alguém para dirigir. Uma pessoa nunca deve tentar dirigir-se a um hospital se sofrer um derrame.

Instruções para superar um acidente vascular cerebral com MMS1 e DMSO

Coágulos de sangue podem causar derrames. DMSO é capaz de dissolver coágulos sanguíneos. MMS1 também trabalha para dissolver coágulos. O uso do DMSO em conjunto com o MMS1 pode ser

muito eficaz tanto para superar um ataque quanto para reparar danos causados por um golpe. Quando um coágulo sanguíneo previne o fluxo sanguíneo para uma determinada área do cérebro, um derrame pode ocorrer e fazer com que essa área específica do cérebro seja desativada. No entanto, se o coágulo sanguíneo puder ser dissolvido usando DMSO e MMS1, o oxigênio será mais uma vez capaz de fluir para essa área do cérebro, de modo que a área do cérebro possa começar a funcionar adequadamente.

Embora as instruções abaixo expliquem o que fazer no início de um AVC, é importante saber que, embora uma pessoa já tenha sofrido um AVC, e seja de algumas horas para um dia ou dois mais tarde, ainda é possível começar e seguir seguindo estas instruções a partir do primeiro dia (ver gráfico no Guia de Dosagem para o Dia 1 do

Protocolo de AVC). Ainda há esperança de que os danos possam ser evitados ou revertidos. Tem sido relatado que, embora muitos meses ou alguns anos tenham se passado após um derrame, se alguém fizer um regime regular de tomar DMSO junto com MMS1, pode reverter parte ou todo o dano.

O gosto do DMSO está longe de ser agradável. No entanto, o benefício de usá-lo supera de longe o mau gosto. O DMSO de qualidade farmacêutica foi descrito como quase sem cheiro ou gosto ruim. Pode ser encontrado na internet e em algumas farmácias. O custo é substancialmente maior.

Dia 1 - no início de um derrame

As instruções abaixo são muito detalhadas. Nós incluímos a Gráfico do Guia de Posologia no final desta seção para ajudar facilitar um seguindo este protocolo.

Entretanto, por favor, não corte os cantos e siga direto para o gráfico; leia atentamente todas as instruções abaixo para obter uma boa compreensão do procedimento.

Primeira hora

□ No início de um acidente vascular cerebral, primeiro, misture 2 colheres de sopa cheias (30 ml) de DMSO diluído em 1/2 xícara (120 ml) de água. Beba imediatamente. Isto é o ponto de partida do protocolo de AVC.

□ Também no início de um acidente vascular cerebral, inicie o Protocolo 6 e 6. São duas doses de 6 gotas de MMS ativada (MMS1), separadas por uma hora. (Consulte a página 169 para detalhes completos do Protocolo 6 e 6.) O MMS1 e o DMSO funcionam em conjunto, portanto a primeira dose de 6 gotas

de MMS1 para um acidente vascular cerebral, deve ser tomada em menos de dois minutos após a primeira dose de DMSO O MMS1 deve ser misturado em uma segunda 1/2 xícara (120 ml) de água. (Deve ser tomado logo após a dose de DMSO, mas não se misture com o DMSO). Se a qualquer momento você perder o limite de dois minutos, sempre siga em frente e tome a dose mesmo que tenham passado três, cinco, dez minutos ou mais. Tente não perder o limite de dois minutos.

□ Quinze minutos após o ponto de partida deste protocolo, deve-se tomar uma segunda dose de 2 colheres de sopa (30 ml) de DMSO em 1/2 xícara (120 ml) de água. Nenhum MMS1 é obtido neste momento.

□ Trinta minutos após o ponto de partida, uma terceira dose de 30 ml (2 colheres de sopa) de DMSO em 1/2 copo (120 ml) de

água deve ser tomada. Nenhum MMS1 é obtido neste momento.

□ Quarenta e cinco minutes depois do ponto de partida, um

quarta dose de 2 colheres de sopa (30 ml) de DMSO em 1/2 xícara

(4 onças / 120 ml) deve ser tomado. Nenhum MMS1 é obtido neste momento.

Segunda hora

□ Uma hora depois de começar este protocolo de acidente vascular cerebral, (que é o início da segunda hora), continuar a tomar DMSO a cada 15 minutos, reduzir a dose para 1 colher (15 ml) de DMSO em 1/4 xícara (2 onças / 60 ml) de água.

□ Também uma hora depois de começar este protocolo de AVC, dentro de dois minutos após tomar a dose de DMSO, tomar outra dose de 6 gotas de MMS1. Esta é a segunda dose de 6 gotas, tomada uma hora

após a primeira dose de 6 gotas. Não tome mais do que duas doses de 6 gotas de MMS1, uma hora por.

Terceira hora

□ Duas horas após o ponto de partida, (que será o início da terceira hora), tome outra dose de DMSO. Continue a tomar 1 colher (15 ml) de DMSO em 1/4 de xícara (2 onças / 60 ml) de água a cada 15 minutos na terceira hora.

□ Também duas horas após o ponto de partida, no início da terceira hora, comece a tomar o Protocolo 1000. Esta é uma dose de 3 gotas de MMS1 a cada hora durante oito horas por dia. Esta dose de 3 gotas de MMS1 deve ser tomada no prazo de dois minutos após a primeira dose de DMSO no início da terceira hora.

□ Geralmente eu sugiro trabalhar gradualmente até a dose de 3 gotas ao

iniciar o Protocolo 1000. Ir para a direita para 3 gotas por hora para o Protocolo Acidente vascular encefálico, é uma exceção à regra. Se, no entanto, a pessoa experimenta uma reação de Herxheimer e se sente nauseada, tem diarreia ou vômitos, corte a dose de MMS1 ao meio. Se necessário, reduza a metade até que esses sintomas desapareçam. Quando os sintomas passarem, gradualmente volte para uma dose de 3 gotas a cada hora, ou para uma dose tão alta que seja confortável para você sem causar uma reação de Herxheimer. Mas não ultrapasse mais de 3 gotas por hora enquanto estiver no protocolo 1000.

Notas

> Lembre-se, se uma pessoa é levada a baixar sua dose de MMS1, deve abaixá-la, mas não pare de tomá-la completamente.

> Até este ponto, a pessoa neste protocolo terá completado três horas no total de tomar DMSO a cada 15 minutos.

> Por favor, tome nota que quando você diminuir a quantidade de DMSO em sua dose, é importante também reduzir a quantidade de água que você mistura com ele.

Quarta a Oitava Hora

□ Depois das primeiras três horas de tomar DMSO a cada 15 minutos nas diferentes dosagens descritas acima, continue tomando DMSO para a parte restante do primeiro dia, mas reduza a frequência de suas doses. Uma vez a cada hora, tome 1 colher (15 ml) de DMSO em 1/4 de xícara (2 onças / 60 ml) de

água. A pessoa já deve ter começado a tomar o Protocolo 1000, que é uma dose de 3 gotas por hora de MMS1. A dose horária

de DMSO e a dose horária de MMS1 devem ser sempre tomadas dentro de dois minutos (máximo).

Notas

> Não misture a dose de MMS1 com a mistura de DMSO. Não confunda isso com outros protocolos em que é necessário adicionar as gotas de DMSO na dose de MMS1. Neste caso, a dose de DMSO é muito maior do que em outros protocolos, portanto, recomenda-se não misturar DMSO na mesma dose com MMS1. Tome a dose de MMS1 em menos de dois minutos após a dose de DMSO, mas separadamente, não no mesmo copo de água.

> Mencionamos aqui o que fazer no "primeiro dia" no início de um derrame. No entanto, um derrame pode ocorrer a qualquer momento, e se alguém sentir um derrame chegando à noite, por exemplo, seria sensato

seguir a dosagem mencionada acima, durante a noite. Em outras palavras, fique acordado ou defina um alarme, se necessário, para tomar suas doses, pois os acidentes vasculares cerebrais podem afligir as pessoas durante o sono.

Dia 2 a 7

□ O segundo dia após um derrame, e depois de um ter seguido o procedimento para o primeiro dia, continue tomando o MMS1, de acordo com o Protocolo 1000. Ele está tomando uma dose de 3 gotas de MMS1 a cada hora durante oito horas consecutivas. Recomendo que você complete as três semanas completas sugeridas para fazer o Protocolo 1000, mesmo que a pessoa comece a se sentir muito melhor, como medida de precaução.

□ No segundo dia após um derrame, pode-se reduzir a ingestão de DMSO para 1 colher de sopa (15 ml) de manhã e 1 colher de sopa

(15 ml) à noite. Esta quantidade de DMSO deve ser tomada em 1/4 de xícara (2 onças / 60 ml) de água. Estas doses de DMSO devem ser tomadas em coordenação com a dosagem de MMS1. Deve-se estar no Protocolo 1000, então sugiro que tomem a dose de DMSO dentro de dois minutos da primeira dose de MMS1 do dia, e a última dose de MMS1 do dia.

Dia 8 a 21

□ Continue o Protocolo 1000, até completar o período de 21 dias.

□ Reduza a ingestão de DMSO para tomar 1 colher de sopa (15 ml) de DMSO apenas uma vez por dia (dentro de dois minutos de uma das suas doses de MMS1), durante os restantes 21 dias.

□ Se você sentir que não está progredindo na sua recuperação, recomendo voltar ao primeiro dia do Protocolo Acidente vascular

cerebral e iniciar todo o processo novamente, conforme descrito acima. Em outras palavras, comece do começo e continue até completar os 21 dias.

Notas

> Se alguém teve um derrame e se recuperou completamente, eu mesmo assim recomendo uma dose de manutenção diária de MMS1 (6 gotas) e 1 colher (15 ml) de DMSO em 1/4 xícara (2 onças / 60ml) de água. Se em algum momento os sintomas de um derrame ocorrerem novamente, o procedimento completo descrito acima deve ser seguido.

> Dê uma olhada em sua dieta e hábitos de exercício para ver se há espaço para melhorias.

> Infelizmente, não há garantia total de recuperação de um AVC. No entanto,

muitas pessoas se recuperaram de acidentes

vasculares cerebrais usando DMSO, e MMS1 também tem sido uma ajuda nesta área.

É importante que você inicie a hora 00:00 imediatamente quando necessário e continue com os intervalos de 15 minutos do seu ponto de partida (por exemplo, se um acidente vascular cerebral for iniciado às 12h20min, comece a tomar DMSO e MMS1 imediatamente e, 15 minutos depois, 12:35 horas e assim por diante).

www.clo2.com.br

https://.t.me/brasilmms